

Cuestionar la seguridad de las vacunas es un tema polémico en muchos países. La presión está en muchos pediatras que argumentan que "los beneficios superan los riesgos" refiriéndose a las vacunas infantiles. Aún así, muchos padres han escuchado las legítimas dudas de muchos otros padres sobre si las vacunas fueron un detonante de la aparición en el autismo ó trastorno neurobiológico de sus hijos.

El creciente número de vacunas dadas a nuestros pequeños en los últimos 20 años, es un tema rara vez tocado por los medios, a pesar de contar con una impresionante [gráfica](#) como esta que muestra un incremento del 260% en las vacunas administradas. (¿Estaban muriendo de enfermedades mortales millones de niños hace 25 años? No, claro que no!). Los padres deberían saber que las vacunas jamás son investigadas por el "riesgo de combinación", sin importar el hecho de que a los pequeños les pueden aplicar hasta 6 vacunas distintas en una sola visita al médico. Lo que puede no significar un riesgo para un pequeño, puede ser de enorme riesgo para otros.

Sugerimos un sencillo plan de 3 puntos para minimizar los potenciales riesgos de la aplicación de vacunas. (Por favor tomar en cuenta que somos padres, no doctores. Éstos no son consejos médicos, son consejos de padres).

1. Toma tus precauciones

- Considera retrasar las vacunas hasta que el pequeño tenga 18 - 24 meses de edad.
- No vacunes si el pequeño está tomando antibióticos.
- No pongas más de una vacuna por visita al médico.
- Si tienes pensado aplicar la vacuna múltiple, pide a el médico que se le apliquen por separado
- Considera dar altas dosis de Vitamina C (3000-5000 mg por día) un día antes, el mismo día y un día después de aplicada la vacuna.
- Con la vacuna múltiple, considera dar altas dosis de Vitamina A (5000 IU ó mas) un día antes, el mismo día y un día después de aplicada la vacuna
- Si el pequeño comienza a presentar retrasos en su desarrollo, deja de vacunar hasta que sepas mas
- Si el pequeño sufre reacciones adversas a la vacuna, deja de vacunar hasta que sepas mas
- Siempre solicita ver el empaque de las vacunas y nunca aceptes una vacuna que contenga Thimerosal como preservativo

2. Considera retrasar las vacunas

En nuestro artículo favorito sobre vacunas, "A User-Friendly Vaccine Schedule", escrito por el cirujano Donald Miller de la Universidad de Washington, el Dr. Miller realiza una serie de

interesantes observaciones como las siguientes:

"Las autoridades públicas de la salud, no han provado que es, efectivamente seguro, la aplicación de tantas vacunas en los pequeños. De hecho, han sido incapaces de explicar por qué, coincidiendo con el aumento de número de vacunas aplicadas ha ocurrido una explosión de desórdenes neurológicos y al sistema inmune de nuestros pequeños"

Comenta también...

"Nuevos conocimientos en neuroinmunología (el estudio de cómo trabaja el sistema inmune cerebral), lanza serios cuestionamientos sobre la inteligencia de inyectar vacunas en pequeños menores de 2 años de edad"

El Dr. Miller recomienda: No aplicar vacunas a los pequeños hasta que cumplan 2 años de edad

3. Considera un calendario alterno de vacunación

Es realmente impactante ver el calendario recomendado de vacunación de 1983 y el actual. Tomemos en cuenta que Estados Unidos es el país con la mayor cantidad de vacunas aplicadas en los pequeños, y es también el país que sufre de mas pequeños con trastornos neurobiológicos. ¿Realmente necesitan tantas vacunas los pequeños hoy en día?

TIMEROSAL

El Timerosal es un conservador a base de mercurio desarrollado en la época de los 1930's y ha sido utilizado en numerosas vacunas. En el Registro Federal de 1982, un panel de expertos de la [FDA](#) (Food And Drug Administration) analizaron el timerosal encontrando que era tóxico y causaba

muerte celular.

Hace una década, la tasa de casos de autismo era de 1-2 por cada 10,000 individuos. Las investigaciones del [CDC](#) (Centers For Disease Control) indican que hoy en día 1 de cada 150 pequeños padecen autismo. Este dramático incremento en las tasas de quienes padecen autismo se relaciona con el incremento a la exposición al mercurio. EL Timerosal apareció en el mercado a mediados de 1930's. El autismo fue en un inicio descrito como un nuevo y nunca antes visto desorden en 1943, en niños nacidos durante la época de 1930's. Los desórdenes neurobiológicos como el autismo tienen síntomas similares al envenenamiento con mercurio.

Miles de familias han reportado que sus pequeños desarrollandose de manera normal cambiaron después de haber recibido vacunas con contenido de mercurio y comenzaron a mostrar síntomas que a la postre condujeron al diagnóstico de autismo. Los síntomas del autismo no solo concuerdan con los de envenenamiento por mercurio, se ha encontrado que en los pequeños que padecen autismo tienen mas cantidad de mercurio en su cuerpo que los niños que no lo padecen.

En Marzo del 2001, la FDA lanzó un comunicado previniendo a las madres embarazadas y a los niños pequeños, advirtiendo de no comer pescados con alto contenido en mercurio por temor a causar problemas neurológicos a los pequeños. A pesar de esto, el Programa de Inmunización Nacional de la CDC ha seguido permitiendo que estas mismas personas con

mayor sensibilidad sean expuestas al mercurio administrando habitualmente vacunas antigripales que contienen mayor cantidad de mercurio que cualquier pescado.

La Agencia de Protección Ambiental [EPA](#) , ha cerrado recientemente escuelas donde se ha encontrado que el nivel de mercurio en el aire era de 30mcg/m. (el nivel de acción de EPA es de 1mcg/m). Aun así, los pequeños inyectados con multiples vacunas que contienen mercurio en los 90's recibieron hasta 187 mcg durante sus primeros 6 meses de vida.

Una típica dosis a un pequeño de solamente 2 meses de edad que ha recibido tres vacunas con mercurio era 125 veces mayor a la tolerancia diaria de exposición que especifica EPA.

¿Cuántos de nuestros países continúan utilizando vacunas con mercurio que en muchos otros países han sido prohibidas?

En 2001, [IOM](#) (Instituto de Medicina) declaró que es "biológicamente posible" que el Timerosal en las vacunas causara autismo, TDA, TDAH y desórdenes de neurodesarrollo en general.

El mercurio, teniendo la certeza que es una de las sustancias mas neurotóxicas en el planeta, debe ser investigado minuciosamente para determinar su impacto en la salud de las personas, asi como establecer los tan necesarios estándares de seguridad. El mercurio en usos medicinales, en emisiones industriales, en las aguas y en la cadena alimenticia de este planeta debe ser reducido.

Comentarios finales

Si el calendario de vacunación de 1983 funcionaba para los pequeños de entonces, por que no funciona para los pequeños de ahora?

Dinamarca, un país de primer mundo al oeste de Europa, cuenta con un calendario de vacunación mucho mas simple que el nuestro. Ellos han reportado también tener un porcentaje mucho mas bajo de pequeños con autismo que nosotros.

Nosotros fuimos alguna vez exactamente como tu, confiabamos plenamente en nuestros pediatras. Vacunabamos a nuestros pequeños según nos indicaba la cartilla de

vacunación. Fue entonces que, algunas veces de inmediato al regresar del médico con la aplicación de alguna vacuna, veíamos a nuestros pequeños cambiar y decender hacia el autismo. La razón por la cual existe este sitio es porque no queremos que te suceda lo mismo a ti ni a tu pequeño. Algunas cosas que hemos aprendido y queremos compartir son:

- Las vacunas son un gran negocio
- Las vacunas tienen grandes riesgos documentados y el gobierno lo sabe
- Existen auténticas preocupaciones sobre la eficacia de algunas vacunas
- Nadie puede obligarte a vacunar a los pequeños ó seguir el calendario de vacunación

Generation Rescue/Safe Minds